

 ULRICEHAMNS KOMMUN	Dokumentnamn:	
	Cytostatika hantering i hemsjukvården.	
	Berörd verksamhet:	
	Sektor Vårld	
Upprättad av:	Godkänd av:	Giltigt från:
MAS	MAS	2018-01-04

Cytostatika hantering i hemsjukvården

I hemsjukvård har hanteringen av cytostatika en annan och mer tillfällig utformning än i slutenvård i och med att hjälp och vård ges i patientens hem.

När en patient behandlas eller har behandlats med cytostatika kan utsöndringstiden och graden av verksam substans som utsöndras skilja sig åt.

Den behandlande enheten ska informera om vilken typ av cytostatika som är aktuell. Se Arbetsmiljöverkets författningssamling.

Avfallshantering i samband med cytostatikabehandling,

Urin

Vid **byte av KAD-påse** rekommenderas att:

- Använda DUBBLA handskar och långärmad rock.
- Tömma påsen långt ner i toalettstolen med så lite stänk som möjligt.
- Stänga locket innan spolning.
- Lägga KAD-påse i dubbla soppåsar och slänga i vanliga sopor/säckar.

Inkontinensskydd läggs i dubbla soppåsar och slängs i vanliga sopor/säckar.

Bäcken

Vid användning av bäcken/urinflaska lät urinen svalna och därefter håll den i toaletten, stäng locket och spola.

Det är bara varm urin eller ånga från den som kan utsöndra läkemedlet.

Toalettbesök

Person som går på toalett på vanligt sätt ska stänga locket och spola 2 gånger.

Spill

Torka upp eventuellt spill med absorberande engångsmaterial.

Undvik svepande rörelser. Tvätta med vatten och därefter ytdesinfektionsmedel.

Använt engångsmaterial läggs i dubbla soppåsar som försluts och läggs i vanliga sopsäckar.

Tvätt

Skyddsrockar och andra textilier som förorenats hanteras som vanlig tvätt.

Vid osäkerhet: kontakta omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

Bilaga 1.

AFS 2005:5

(Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt.)

Dokumentnamn	Förvaringsplats	Ansvar	Arkiveringstid/
Cytostatika hantering i hemsjukvården.	Styrdokument Hälso- och sjukvård	MAS VC, EC	