



Bedömning av smittfrihet efter bekräftad Covid19-smitta

Beräkningsmall utifrån [Folkhälsomyndighetens kriterier för bedömning av smittfrihet](#)

Nedan är några exempel på hur man ska beräkna smittfrihet om en patient/brukare uppvisar sina första symtom t.ex den 4 maj:

Patienter/brukare

Ange insjuknandedag och lägg till minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring

Ex.1 Symtom 4 maj+14dagar = 18 maj, är kliniskt stabil men feberfri först 18 maj, då läggs ytterligare två dagar till= Smittfri 20 maj

Ex. 2 Symtom 4 maj+14 dagar =18 maj, är kliniskt stabil och feberfri 10 maj = Smittfri 18 maj

För sjukhusvårdade personer som haft en svårare sjukdomsbild så är kriterierna minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring samt minst 14 dagar från insjuknandedagen, ända upp till 21 dagar för de allra sjukaste som också behövt vård på IVA.

Personal och personer som vårdats i ordinärt boende

Smittfrihet bedöms efter minst två dygns feberfrihet och allmän förbättring samt när det gått minst sju dygn sedan insjuknandet.

Ex. Symtom 4 maj, symtomfri 7 maj men måste vänta i 7 dygn sen insjuknandet = 11 maj innan personalen betraktas som smittfri.

Ex. Symtom 4 maj, symtomfri 11 maj = 7 dygn men måste vänta ytterligare 2 dygn sen insjuknandet = 13 maj.