

 ULRICEHAMNS KOMMUN	Dokumentnamn: Rutin för vaccination mot Covid 19	
	Berörd verksamhet: Sektor Vårld	
Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	Beslutad av: MAS	Giltigt från: 210224 ver.4

Rutin för vaccination mot covid-19 i Ulricehamns kommun

Hygien

- Tillämpa alltid **basala hygienrutiner** och klädregler samt arbeta aseptiskt.
- Visir och munskydd används under hela vaccinationsprocessen.

Akututrustning

Säkerställ att akututrustning med läkemedel och generellt direktiv för behandling av allergiska reaktioner finns tillgängligt i samband med att vaccinering utförs.

När kan vaccinet ges:

- Har patienten haft covid-19 ska dos 1 ges tidigast 4 veckor efter symtomdebut.
- Är patienten med i en screening och inte har symtom kan vaccinet ges, man behöver då inte invänta provsvar.
- Har patienten vaccinerats mot säsongsinfluensa, avvakta 2 veckor innan vaccin ges.
- Vaccinet ska inte ges vid feber eller annan pågående infektion.
- Samma vaccin ska ges för både dos 1 och dos 2.

Genomgång av Hälsodeklaration inför ordination

Antikoagulantia eller trombocythämmare – planera!

Patienter som behandlas med antikoagulantia eller trombocythämmare kan behöva justera mediciner eller ta PK-prov inför vaccination, viktig information ges i:

[Terapiråd vid Covid-19 vaccination](#)

Allergier/överkänslighet – planera!

Patienter med känd allergi och överkänslighet läs [VGR:s rutin](#)

Patienter som haft kraftig reaktion med anafylaxi ska vaccineras på vårdcentral eller sjukhus där tillgång till syrgas finns.

Informera ansvarig läkare som bedömer om och var vaccination kan ske eller om remiss ska skrivas till annan specialistmottagning.

Ordination

- Ordination av vaccin får göras av läkare och distriktssköterska.
- Om läkare bedömt att vaccination ska ges på vårdcentral ska läkare ordinaera.
- Vid tveksamhet för ordination kontakta läkare.

Iordningställande

- Se instruktion från respektive tillverkare.
- Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid
- Tänk på att dra upp tillräcklig mängd i sprutan så att exakt dos kan justeras efter att injektionskanylen är påsatt.
- Märk sprutan med namn med aktuellt vaccin och aktuellt klockslag för beredning.

Före administrering

- Identitetskontroll
- Förbered så att patienten kan övervakas minst 15 minuter efter vaccination.

Administrering

Injektionen ges enligt tillverkarens anvisningar.

Efter vaccination

- Övervakning av patient i minst 15 minuter efter given vaccination.
- För patienter med antikoagulantia – tryck minst 10 minuter efter injektion.
- Förse patienten med vaccinationskort och patientinformation om Covid-19 vaccination.
- Efter dos 1 är det viktigt att tillse att tidigaste datum för dos 2 anges på kortet.
- Batchklisterlapparna ska klistras på hälsodeklarationen.

Dokumentation av vaccination

- Ordination och dokumentation sker i patientjournal i vårdplan; Läkemedelshantering/insats Covidvaccination.
- Vaccination och Hälsodeklaration skall även föras in i Svevac.
- Dokumentera på särskild lista över vaccinerade.

Avfallshantering

- Läkemedelsavfall som uppstår i samband med Covid-19-vaccination klassas som riskavfall och hanteras enligt rutin.
- Stickande/skärande avfall ska samlas upp i avsedda avfallskärl.

Symtom/reaktion efter vaccin

- För handläggning av symtom eller reaktion efter vaccination se separat rutin.
- Rapportering av biverkningar ska ske till Läkemedelsverket, kan göras digitalt [Länk](#)
- Lokala reaktioner som ömhet och rodnad vid injektionsstället behöver inte rapporteras.
- Registrering av biverkning ska även ske i Svevac.