

 ULRICEHAMNS KOMMUN	Dokumentnamn: Rutin för vaccination mot Covid 19	
	Berörd verksamhet: Sektor Vårld	
Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	Beslutad av: MAS	Giltigt från: Rev. 211005

Rutin för vaccination mot covid-19 i Ulricehamns kommun

- **Basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.**
- **Visir och munskydd används under hela vaccinationsprocessen.**

Akututrustning

Säkerställ att akututrustning med läkemedel och generellt direktiv för behandling av allergiska reaktioner finns tillgängligt i samband med vaccineringen.

När kan vaccinet ges:

- Har patienten haft covid-19 ska personen vara helt återställd innan vaccin ges.
- Har patienten vaccinerats mot säsongsinfluensa, avvakta 2 veckor innan vaccin ges.
- Vaccinet ska inte ges vid feber eller annan pågående infektion.
- Är patienten med i en screening och inte har symtom kan vaccinet ges, man behöver inte invänta provsvar.

Influensavaccin och Covid-19 vaccin

- Vaxigrip Tetra kan ges samtidigt med vaccination mot Covid-19
- Vid vaccination med högdosvaccinet Fluzone HD måste det gå sju dagar mellan vaccinationerna.
-

Hälsodeklaration och ordination

- Ordination av vaccin får göras av läkare och distriktssköterska
- Genomgång av hälsodeklaration.
- Om patienten behandlas med antikoagulantia kontrollera särskild regional riktlinje för särskilda åtgärder före vaccination, t.ex PK-värde för Waranbehandlad patient.
- Vid tveksamhet för ordination kontakta läkare.

Iordningställande

- Se instruktion från respektive tillverkare.
- Rengör och desinfektera arbetsytan med ytdesinfektionsmedel med tensid.
- Tänk på att dra upp tillräcklig mängd i sprutan så att exakt dos kan justeras efter att injektionskanylen är påsatt.
- Märk sprutan med namn med aktuellt vaccin och aktuellt klockslag för beredning.

Före administrering

- Identitetskontroll
- Förbered så att patienten kan övervakas minst 15 minuter efter vaccination.

Administrering

Injektionen ges enligt tillverkarens anvisningar. För patienter med antikoagulantia se särskild instruktion VGR.

Efter vaccination

- Övervakning av patient i minst 15 minuter efter given vaccination.
- För patienter med antikoagulantia – se särskild instruktion över insticksstället.
- Förse patienten med vaccinationskort och patientinformation om Covid-19 vaccination.
- Efter dos 1 är det viktigt att tillse att tidigaste datum för dos 2 anges på kortet.
- Batchlapparna ska klistras på hälsodeklarationen.

Dokumentation av vaccination

- Ordination och dokumentation sker i patientjournal i vårdplan Läkemedelshantering/insats Covidvaccination.
- Vaccination och Hälsodeklaration skall även föras in i Svevac.
- Dokumentera på särskild lista över vaccinerade.

Avfallshantering

- Läkemedelsavfall som uppstår i samband med Covid-19-vaccination klassas som riskavfall och hanteras enligt rutin.
- Stickande/skärande avfall ska samlas upp i avsedda avfallskärl.

Symtom/reaktion efter vaccin

- För handläggning av symtom eller reaktion efter vaccination se separat rutin.
- Rapportering av alla biverkningar ska ske till Läkemedelsverket.
- Registrering av biverkning ska även ske i Svevac.