

vaccination  ULRICEHAMNS KOMMUN	Dokumentnamn: Rutin vid biverkning/symtom efter Covid 19	
Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)	Berörd verksamhet: Sektor Vårld	
	Beslutad av: MAS	Giltigt från: Rev. 211005

Rutin vid biverkning/symtom efter vaccination covid-19

Rutinen ska tillämpas t.o.m en vecka efter att vaccindos givits och gäller symtom på Covid 19 infektion.

Lokala reaktioner kring instickstället t.ex.:

- rodnad,
- värmeökning,
- smärta

Allmänna symtom t.ex.:

- feber,
- huvudvärk,
- smärta i kroppen,
- förkylningssymtom som snuva, hosta mm

Åtgärder

- Lokala reaktioner följs upp och dokumenteras av sjuksköterska.
- Vid allmänna symtom kan inte infektion av Covid 19 uteslutas utan patienten ska bedömas som smittad och rutin för misstänkt smitta ska följas med bedömningar och PCR-prov.
- Vid allmänpåverkan använd ViSam för bedömning.

Dokumentation

- Sjuksköterska dokumenterar biverkning/symtom i patientens journal. Ange även antal timmar/dagar sedan vaccination.
- Dokumentation i Svevac
- Rapportering till Läkemedelsverket, [Läkemedel | Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency \(lakemedelsverket.se\)](https://lakemedel.lakemedelsverket.se)