

 ULRICEHAMNS KOMMUN	Dokumentnamn: Rutin för vaccination mot Covid 19	
	Berörd verksamhet: Sektor Vårld	
Upprättad av: Medicinskt ansvarig sjukskoterska (MAS)	Beslutad av: MAS	Giltigt från: Rev. 220909

Rutin för vaccination mot covid-19

- **Basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.**
- **Munskydd används vid vaccination.**

Akututrustning

Säkerställ att akututrustning med läkemedel och generellt direktiv för behandling av allergiska reaktioner finns tillgängligt i samband med vaccineringen.

När kan vaccinet ges:

- Har patienten haft covid-19 ska personen vara helt återställd innan vaccin ges.
- Vaccinet ska inte ges vid feber eller annan pågående infektion.
- Är patienten med i en screening och inte har symtom kan vaccinet ges, provsvar behöver inte inväntas.
- Mellan dos 3 och 4 ska vara minst fyra månader
- Mellan dos 4 och 5 ska vara minst fyra månader

Influensavaccin och Covid-19 vaccin

- *Vaxigrip Tetra* kan ges samtidigt med vaccination mot Covid-19 till personer 18år och äldre. För yngre personer måste det gå 7 dagar mellan vaccinationerna.
- *Fluad Tetra* kan ges samtidigt som mRNA-vaccinerna Comirnaty och Spikevax. Fluad Tetra rekommenderas dock inte att ges samtidigt som det proteinbaserade vaccinet Nuvaxovid.

Hälsodeklaration och ordination

- Ordination av vaccin får göras av läkare och distriktsskoterska.
- Hälsodeklaration ska inhämtas från patienten.
- Om patienten behandlas med antikoagulantia kontrollera särskild regional riktlinje för särskilda åtgärder före vaccination, t.ex. PK-värde för Waranbehandad patient.
- Vid tveksamhet för ordination kontakta läkare.

Iordningställande

- Se instruktion från respektive tillverkare.
- Tillämpa basala hygienrutiner.
- Rengör och desinfektera arbetsytan med ytdesinfektionsmedel med tensid.

- Tänk på att dra upp tillräcklig mängd i sprutan så att exakt dos kan justeras. Sätt på propp om sprutan ska transporteras utanför enheten. Blå kanyl används till injektion. Grön kanyl används vid uppdragning.
- Märk sprutan med namn med aktuellt vaccin och aktuellt klockslag för bruten ampull.
- Bruten ampull är hållbar i 12 timmar, förvaras i rumstemperatur.

Före administrering

- Identitetskontroll.
- Förbered så att patienten kan övervakas minst 15 minuter efter vaccination.

Administrering

- Tillämpa basala hygienrutiner och använd munskydd.
- Injektionen ges enligt tillverkarens anvisningar.

Efter vaccination

- Övervakning av patient i minst 15 minuter efter given vaccination.
- För patienter med antikoagulantia, kompression 10 minuter.

Vaccinationskort

- Förse patienten med vaccinationskort.

Dokumentation

- Ordination, administrering och batchnummer dokumenteras i patientjournalen i vårdplan [Läkemedelshantering/insats Covidvaccination](#).
- Vaccination och Hälsodeklaration skall även föras in i Svevac.

Avfallshantering

- Läkemedelsavfall som uppstår i samband med Covid-19-vaccination klassas som riskavfall och hanteras enligt rutin.
- Stickande/skärande avfall ska samlas upp i avsedda avfallskärl.

Symtom/reaktion efter vaccin

- För handläggning av symtom eller reaktion efter vaccination se separat rutin.
- Rapportering av allvarligare biverkningar ska ske till Läkemedelsverket samt registreras i Svevac.

[Patienter behandlade med antikoagulantia/trombocythämmare, VGR](#)
[Vaccination mot covid-19 hos Waran-behandlade patienter, VGR](#)